

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

METRICURE

Uterus içi Süspansiyon
Veteriner Uterus İçi Antibakteriyel

BİLEŞİMİ:

Metricure Uterus İçi Süspansiyon , krem renkli homojen bir süspansiyon olup, kullanıma hazır 19 g'lık her bir enjektör 500 mg benzatin sefapirin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Sefapirin, Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteri türlerine karşı, diğer sefalosporinlerde olduğu gibi bakterinin hücre duvarı sentezini inhibe etmek suretiyle bakterisid etkili ve geniş spektrumlu bir 1. kuşak sefalosporin türevidir. Sefapirin, enfekte uterustaki gibi anaerobik ortamlarda aktiftir. Metricure Uterus İçi Süspansiyonu ile yapılan tek uygulamadan sonra, endometrial dokudaki sefapirin konsantrasyonu, en az 24 saat süreyle, patojen bakteriler için gereken MIC₉₀ (Minimum İnhibitör Konsantrasyon) seviyesinden yüksektir. Süspansiyon iyi tolere edilir ve sefapirinin endometriuma geçişine olanak tanır ve kolaylıkla uygulanabilir.

Uterus içi uygulamayı takiben, 1-2 saatte maksimum plazma seviyelerine ulaşmakta ve 24 saat sonra plazmada tespit edilememektedir. Sefapirin hemen hemen tamamen böbrekler yoluyla ve az bir oranda da safrayla atılır.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

İneklerde, doğum sonrası 14. günden itibaren ve yeni gebelikten önceki dönemde, sefapirine duyarlı bakterilerin neden olduğu, subakut ve kronik endometritis olgularının tedavisinde endikedir. Sefapirine duyarlı önemli endometrititis patojenleri; Actinomyces pyogenes ve Fusobacterium necrophorum gibi anaerob bakteriler ve siyah pigmentli Gram-negatif anaeroblardır. Metricure Uterus İçi Süspansiyonu, fertilite problemlerine yol açan bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu çeviren inek (Repeat Breeder; 3 tohumlamadan sonra gebe kalmayan inekler) olgularının tedavisinde de kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Metricure Uterus İçi Süspansiyon, beraberinde verilen tek kullanımlık kateter yardımı ile serviksten geçilerek uterus içerisine uygulanır:

- Enjektörün ucunu, kateterin içine yerleştiriniz.
- Eldivenli elinizle rektuma girerek, serviks uteri'yi kavrayınız.
- Kateteri, serviksten uterus lümenine doğru yumuşak hareketlerle itiniz.
- Metricure Uterus İçi Süspansiyon içeriğini enjekte ediniz.

Metricure Uterus İçi Süspansiyon ile yapılan tek tedavi, genelde tam bir iyileşme için yeterlidir. Metricure Uterus İçi Süspansiyon, tohumlanan hayvanlarda tohumlamadan 1 gün sonra kullanılabilir.

Pyometra olgularında, luteolizisi başlatmak ve uterus boşluğundaki içeriğin atılmasını uyarmak için prostaglandinlerle ön tedavi önerilmektedir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER: Alerjik reaksiyonlar çok nadir durumlarda görülmüştür.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ : Diğer antibiyotiklerle beraber intauterin olarak kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Süt için ilaç kalıntı arınma süresi 0 gündür.

KONTRENDİKASYONLAR :Gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Sefalosporinlere alerjisi olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime başvurunuz

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Sefalosporinlere ve penisilinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz veya dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir.

HAYVANLARDA KULLANIMDA ÖZEL ÖNLEMLER:

Ürünün kullanımı, hayvandan izole edilen bakterilerin duyarlılık testlerine dayanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda terapi, hedef bakterilerin yatkınlığı hakkında yerel epidemiyolojik bilgilere dayanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ :25 °C'nin altında oda ısısında saklandığı takdirde raf ömrü 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1, 3, 10 adet beyaz plastik enjektör ve aynı sayıda renksiz plastik kateter ile mavi naylon eldiven içeren karton kutularda satılır

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI : Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenahanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:

21.07.2017

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE
NUMARASI:**

26.12.2002-8/780

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ:

İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic.Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Büyükdere cad. No:199 Levent 199 Ofis bloğu Kat:13-14-15

Şişli/İstanbul

ÜRETİM YERİ: INTERVET International BV. Wim de Körverstraat 35 5831 AN
Boxmeer- Hollanda'da üretilmiştir.