

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

NEO-CAF

Deri Spreyi

Veteriner Deri Antibakteriyeli

BİLEŞİMİ

Neo-Caf Sprey, yeşil ila yeşil-mavi renkte bir süspansiyon olup 200 ml ürün içeren bir kutu 4.63 gram oksitetrasikline eşit 5 gram oksitetrasiklin hidroklorür ve renklendirici olarak 0.25 gram Patent mavi V (E131) içermektedir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler

Oksitetrasiklin *Streptomyces rimosus* fermentasyonu ile üretilir. Çok sayıda Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler ile protozoa, Mycoplasma, Chlamydia ve Rickettsiae'ları içeren çok geniş bir antimikrobiyal etkili spektruma sahiptir. Oksitetrasiklin bakteriyostatiktir ve hücrel protein sentezini inhibe ederek etki gösterir.

Farmakokinetik özellikler

Lokal uygulanan oksitetrasiklin emilimi ihmal edilebilir ve ana etkin madde, vücut yüzeyinin dışına, deri yüzeyinde ve yüzeysel lezyonlarda bulunan bakterilerle doğrudan temas eder. Renklendirici, uygulama yapılan alanın sınırlarını görüntülemeyi sağlar.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Neo-Caf Sprey sığır ve koyunlarda oksitetrasikline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu deri ve ayaktaki topikal enfeksiyonların tedavi ve kontrolünde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Tedavi edilecek bölgeyi yıkayın ve 15-20 cm uzaklıktan 1-2 saniye süre ile tedavi edilecek bölge eşit miktarda boyanana kadar spreyi sıkın. Dozu hayvan başına 74-148 mg/gün değerine denktir. Bu uygulamayı 12 saatte bir 1-3 gün boyunca iyileşme durumuna göre tekrarlayın. Ürünün uygulanması sonrasında ürün uygulanan bölgenin hayvanlar tarafından yalanmaması için önlemler alınmalıdır.

Ayak enfeksiyonlarının tedavisinde daha iyi sonuçlar alabilmek için:

- Ayağı kirden, nekrotik dokulardan ve irinli akıntıdan arındırarak iyice temizleyin.
- İlacın kullanımından sonra hayvanı 24 saat kuru zeminde tutunuz.

Kutu tersten tutularak püskürtebilme özelliğine sahiptir

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Sadece harici kullanım içindir.

Tırnak bölgesine uygulama yapıldıktan sonra hayvanlar en az 1 saat kuru bir yüzeyde tutulmalıdır.

Tedavi edilen hayvanlar temiz tutulmalıdır.

Göze ve göz çevresine uygulanmamalı ve temasından kaçınılmalıdır.

Bu ürünü hayvanlardan elde edilen bakteriler için yapılmış duyarlılık test sonuçlarına göre kullanınız. Eğer bu mümkün değilse hedef bakterilerin duyarlılığı ile ilgili bölgesel epidemiyolojik bilgilere göre kullanınız.

Uygulamada ülkesel ve bölgesel antimikrobiyal politikaları dikkate alınmalıdır.

Bu ürünün ürün özellikleri özetinde belirtilen talimatlara uygun şekilde kullanılmaması, oksitetrasikline dirençli bakterilerin gelişmesine ve muhtemel çapraz direnç nedeniyle diğer antibiyotiklerin etkinliğinin azalmasına neden olabilir.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım: Neo-Caf Sprey topikal kullanım amaçlı olduğundan dolayı gebelik ve laktasyonda kullanımının sakıncası yoktur.

İSTENMEYEN ETKİLER

Tüm tetrasiklinlerde olduğu gibi, alerjik ve fotosensitivite reaksiyonları seyrek olarak gözlemlenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Neo-Caf Sprey sadece lokal olarak kullanıldığından diğer ilaçlar ile sistemik olarak etkileşmesi beklenmez.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Uygulanamaz.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Sıfır “0” gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Etkin maddeye veya etkin maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız. Ozon tabakasına zarar veren gazlar içermez.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Ürünü kullanırken yemek yemeyin veya sigara içmeyin.

Solumayınız ve gözlerinizle ve diğer mukoz membranlarla temasından kaçınınız. Kazara temas durumunda, ellerinizi ve cildinizde bulaşan diğer bölgeleri iyice yıkayın. Gözler ve mukoz membranlara bulaşması durumunda, derhal bol su ile yıkayın.

Spreyi iç mekanlarda kullanırken yeterli havalandırma olduğundan emin olun. Bu ürünün içeriği üretim esnasında sıkıştırılmıştır. Bu sebeple 50 °C’ın üzerindeki sıcaklıklara veya güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. İçerik son derece yanıcıdır. Boşalması halinde kutu ezilip kırılmamalı veya ateşe atılmamalıdır.

Ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Açık alev veya akkor haline gelmiş herhangi bir materyalin üzerine püskürtmeyiniz.

Tetrasiklinlere bilinen aşırı duyarlılığı olan kişiler ürünle temastan kaçınmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

25 °C’nin altında, kendi ambalajı içinde, dondurmadan ve buzdolabına konulmadan saklayınız. Basınçlı kutu, güneş ışığından koruyunuz ve 50 °C’nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Kullandıktan sonra bile delmeyin ya da yakmayın.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

Kullanım sonrası kırmayınız, delmeyiniz veya ateşe atmayınız. Boşken dahi tüpler kırılmamalı ve ateşe atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

200 ml ürün içeren 270 ml hacimli aerosol kaplarda satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane, polikliniklerde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 03.06.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
08.02.2000 - 007/0634

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Intervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.

Esentepe mah. Büyükdere cad. No: 199 Levent 199 Ofis bloğu Kat:13-14-15 Şişli/ İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Aprilia Animal Health SRL

Via Nettunense Km 20, 238 Snc

04011 Aprilia, İtalya

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):



H222: YÜKSEK

DERECEDE

YANICI AEROSOL