

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Nobilis® IB Multi+ND+EDS

Tavuklarda enfeksiyöz bronşitis (Massachusetts ve D207/D274 serotipi)

Newcastle hastalığı ve EDS 76'ya karşı inaktif, kombine aşı

Enjeksiyonluk Emülsiyon

BİLEŞİMİ

Tavuklarda enfeksiyöz bronşitis (IBV), Massachusetts ve D207/D274 serotipi, Newcastle hastalığı ve yumurta veriminde düşüş sendromu (EDS) 76'ya karşı hazırlanmış inaktif kombine aşıdır. Adjuvan olarak sıvı parafin içermektedir.

Her 0,5 ml'lik dozda (1 doz):

Aşağıdaki inaktif viral antijenleri içerir;

IBV M41 suşu: İndüklediği $\geq 5,5 \log_2$ VN ünitesi*

IBV 249G suşu: İndüklediği $\geq 4,0 \log_2$ VN ünitesi*

EDS'76 BC14 suşu: İndüklediği $\geq 6,5 \log_2$ HI ünitesi*

NDV Clone 30 suşu: İndüklediği her bir dozun 1/50'si için $\geq 4,0 \log_2$ HI* ünitesi veya en az $\geq 50 \text{ PD}_{50}^{**}$ ünitesi

*Tavuklardaki serolojik yanıt

**PD₅₀= Koruyucu doz 50%

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER

Tavukların Enfeksiyöz bronşitis (Massachusetts serotipi), Newcastle hastalığı ve yumurta veriminde düşüş sendromu 76'ya karşı bağışıklık amacıyla hazırlanan inaktif, kombine aşı.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

12-20 haftalık damızlık ve yumurtacı tavukların, kanatlı enfeksiyöz bronşitis virüsü Massachusetts serotipinin neden olduğu hastalıklara karşı ve kanatlı enfeksiyöz bronşitis virüsünün D207/D274 serotipinin yol açtığı yumurta verimindeki düşüşün ve yumurta kabuğundaki kusurların azaltılması için aktif immunizasyon;

12-20 haftalık damızlık ve yumurtacı tavukların Newcastle Hastalığı virüsüne karşı aktif yeniden immunizasyonu;

12-20 haftalık damızlık ve yumurtacı tavukların, yumurta veriminde düşüş sendromu EDS'76'ya karşı aktif immunizasyonu sağlamak amacıyla kullanılır.

İmmünite başlangıcı: 4 hafta

İmmünite süresi: 1 yumurtlama periyodu

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Uygulama yolu: 0.5 ml'lik bir doz aşısı kas içi veya deri altı enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Hedef hayvan türü: Tavuklar (damızlık ve yumurtacı tavuklar)

Tavsiye edilen aşı programı:

Temel aşılama:

Bağışıklığın oluşturulması için hayvanların öncelikle bu veteriner tıbbi ürününün üreticisine ait bir canlı enfeksiyöz bronşitis virüsü aşısı (virüs suşları MA5, H120 veya D274) ve Newcastle Hastalığı virüsü aşısı (virus suşu Clone 30 veya LaSota) ile hazırlanması önerilir.

Tekrar aşılama:

Veteriner tıbbi ürününün her hayvan için bir dozluk tek aşılaması kuşlara yaklaşık

12-20 haftalık iken ancak yumurtlamanın başlamasının beklendiği tarihten en fazla

4 hafta öncesinde yapılmalıdır.

Ömer Faruk BİLGİCİ

Bakan'a

Daire Başkanı

YAN SAKATLIK

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aşıyı kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin (15-25°C).
Kullanım öncesinde ve kullanım esnasında şişeyi düzenli olarak iyice çalkalayın.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Maternal antikorlar aşılanmanın sonucunu negatif etkileyebilir. Yumurta veriminde düşüş etkililiği sadece kanatlı enfeksiyöz bronşitis virüsü Massachusetts serotipi için kanıtlanmıştır.

Gebelik Laktasyon Ve Yumurtlama Periyodunda Kullanımı: Uygulanamaz.

İSTENMEYEN ETKİLER

Lokal aşılama reaksiyonu görülebilir. Aşılamadan sonraki birkaç hafta boyunca aşılama bölgesinde hafif geçici bir şişlik hissedilebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bu aşının diğerleriyle uyumluluğuna ilişkin bilgi mevcut değildir. Bu nedenle, başka bir ürünle kullanıldığında (aynı gün veya bundan hemen önce /sonra) bu ürünün güvenliği ve etkililiği gösterilmemiştir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Lokal aşılama reaksiyonu görülebilir. Aşılamadan sonraki birkaç hafta boyunca aşılama bölgesinde hafif geçici bir şişlik hissedilebilir. Semptomatik tedavi yapılır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Kalıntı arınma süresi et ve yumurta için "0" (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Kuluçkadaki tavuklarda kullanmayınız.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Kullanıcı için:

Bu ürün mineral yağ içerir. Kazayla enjeksiyon / kendine enjeksiyon, özellikle bir ekleme veya parmağa enjeksiyon durumunda şiddetli ağrı ve şişlik meydana gelebilir ve nadir durumlarda derhal doktora başvurulmazsa etkilenen parmak kaybedilebilir.


Eğer bu ürünü kazayla kendinize enjekte ederseniz, çok küçük bir miktar enjekte edilmiş olsa bile derhal bir doktora başvurun ve prospektüsü yanınızda götürün.

Doktorun muayenesinden sonra ağrı 12 saat boyunca sürerse, tekrar doktora başvurun.

Hekim için:

Bu ürün mineral yağ içerir. Küçük miktarlarda dahi olsa bu ürünün kazayla enjeksiyonu iskemik nekroza, hatta parmağın kaybına yol açabilecek yoğun şişliğe sebep olabilir. Bir uzman tarafından ACİL cerrahi müdahale gerekir. Özellikle parmak pulpasının veya tendonun etkilenmesi durumunda enjeksiyon uygulanan alanın erken insizyonu ve irigasyonu gerekebilir.

Ömer Faruk ÖLÇÜCÜ
Bakan
Daire Başkanı



MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Aşı 2°C - 8°C arasında buzdolabında, dondurulmadan, karanlık ortamda muhafaza edilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Şişe açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış olan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla çıkmış olan atıklar ve artıklar, yerel yasaların ve mevzuatın öngördüğü hükümlere uygun şekilde yok edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Hidrolik sınıf II cam (Ph. Eur.) veya polietilen tereftalat (PET) şişe. 250 ml (500 doz) veya 500 ml (1000 doz) aşı içeren şişeler bir nitril kauçuk tıpa ile kapatılır ve kodlanmış bir alüminyum kapakla mühürlenir. Kutusuz olarak piyasaya verilir.

Tüm ambalaj boyutları pazarlanmayabilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 18.08.2023

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 14.12.2010

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199 Ofis Bloğu
Kat:13-14-15 Şişli/İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35 Boxmeer, 5831 AN, Hollanda


Ömer Faruk BİLGİÇ
Başkan
Daire Başkanı