

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

NOBİLIS® MA5+CLONE 30

Dondurulmuş Liyofilizat ve Çözücüsü

Tavuklarda Enfeksiyöz Bronşit (Massachusetts) ve Newcastle hastalığına karşı canlı liyofilize aşı

BİLEŞİMİ

NOBİLIS MA5+Clone 30; tavuklarda enfeksiyöz bronşit ve Newcastle hastalığına karşı bağışıklık amacıyla hazırlanmış canlı liyofilize aşıdır. Her doz aşı, en az $10^{3.0}$ EID₅₀ Enfeksiyöz Bronşit virüsü suş MA5 (Massachusetts serotipi) ve $10^{6.0}$ EID₅₀ Newcastle virüsü suş Clone 30 içerir.

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Canlı viral aşılar

ATCvet kodu: QI01AD11

Kanatlı enfeksiyöz bronşit virüsü ve Newcastle hastalığı virüsüne karşı aktif bağışıklığın uyarılması.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Tavukların kanatlı enfeksiyöz bronşit virüsü, Massachusetts serotipi ve Newcastle hastalığının neden olduğu solunum yolu hastalığına karşı aktif bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır.

Bağışıklık süresi:

Bu ürün ile talimatlar uyarınca aşılamaı takiben, kanatlı enfeksiyöz bronşitine karşı 2 aylık ve Newcastle hastalığına karşı 6 haftalık bir bağışıklık süresi doğrulanmıştır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

1 g nl kten itibaren solunum, kaba respiratuvar veya ok ler/nazal aşılama yoluyla veya 4 haftalıktan itibaren oral aşılama yoluyla her kanatlıya 1 doz.

Aşı kapların i erisinde dondurularak kurutulmuş k recikler olarak verilmektedir. Kap i erisindeki  r n kahverengimsi ise veya i eri i kaba yapışmışsa  r n  kullanmayınız, bu durum kabın b t nl   n n bozuldu unu g sterir. Her bir kap a ıldıktan hemen sonra ve eksiksiz olarak kullanılmalıdır.

Kabın i eri i suya d k lmelidir. Aşıyı i eren su kullanılmadan  nce iyice karıştırmalıdır. Hazırlandıktan sonra s spansiyon berrak g z k r.

Sprey uygulama:

4 haftalı a kadar olan civcivler i in 1000 dozu 0,5-1 litre i erisinde  z nd r n;

4 haftalıktan itibaren kanatlılar i in 1000 dozu 1 litrede  z nd r n.

Kaba sprej: 1000 doz 250 ml su i erisinde  z d r l r.

Aşı demir ve klor i ermeyen so uk, temiz suda  z d r lmelidir.

Kapların i eri i suya d k lmelidir. Aşıyı i erden su kullanılmadan  nce iyice karıştırmalıdır. Hazırlandıktan sonra s spansiyon berrak g z k r.

Sprey ekipmanının tortu, korozyon ve dezenfektan veya antiseptik izlerinden arındırılmış olması ve ideal olarak yalnızca aşılama i in kullanılması gerekmektedir. Aşı s spansiyonu,

tercihen kanatlılar loş ışıktaki bir arada iken, 30-40 cm uzaktan kanatlıların üzerine eşit olarak püskürtülmelidir.

Oküler/intranazal yol, damlalık yöntemi ile uygulama:

Aşığı kutuda bulunan miktarda süspansiyon sıvısı (Solvans Oculo/Nasal) içerisinde çözündürün: Her 1000 doz için 30-34 ml veya her 2500 doz için 77-81 ml.

Uygulama için: her kanatlı için kutuda bulunan damlalıktan bir damla.

Bir burun deliğine veya bir göze birkaç santimetre yükseklikten bir damla uygulanmalıdır.

Uygulayıcı, burun damlasının kanatlı tarafından solunduğundan emin olmalıdır.

Not: Okülonazal uygulama için özel bir seyreltici (Solvans Oculo/Nasal) mevcuttur.

Oral, içme suyu ile:

Kapların içeriğı su içerisine dökülmelidir. Aşığı içeren su kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Hazırlandıktan sonra süspansiyon berrak gözükür. Aşı, klor ve demir içermeyen soğuk, temiz suda sulandırılmalıdır. Her litre suya 2 gram yağsız süt tozu eklendiğinde virüs çok daha uzun süre etkinliğini korur. Tüm aşı içeren suyun 2 saat içinde alınmasını sağlayın.

Hava koşullarına bağılı olarak, aşılamaadan önce kanatlıların susuz bırakılması tavsiye edilebilir. Yeterli içme alanı sağlamak için yeterli sayıda su kabı bulunmalıdır. Su kapları temiz olmalı ve temizlik malzemesi ve antiseptik içermemelidir. 1000 doz, kanatlı gün içindeki yaşı kadar litre suda, maksimum 40 litreye kadar çözdürülmelidir.

Aşı, en önemli içme zamanı olduğundan, sabah erken saatlerde veya sıcak bir günün serinleme zamanında uygulanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Maternal antikorların aşılamanın sonucu üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

Dezenfektan kalıntısı bulunmayan temiz ekipman kullanın.

Yumurtlama döneminde: Kuluçka döneminde kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Hafif ve geçici bir aşılama reaksiyonu meydana gelebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bu aşının başka bir tıbbi ürün ile eşzamanlı kullanılmasının güvenilirliği ve etkinliğine dair veriler bulunmamaktadır. Bu ürünün diğer veteriner tıbbi ürün öncesinde ya da sonrasında kullanımına vaka bazında karar verilmelidir.

Veteriner tıbbi ürünle birlikte kullanılması tavsiye edilen çözücü dışında başka bir veteriner tıbbi ürünle karıştırmayın.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doz aşımı olması durumunda “İstenmeyen Etkiler”de belirtilenler başka yan etki beklenmemektedir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Organ (et): 7 gün

Yumurta: 0 gün

KONTRENDİKASYONLAR

Bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Veteriner tıbbi ürünü kullanılırken bir maske, eldiven ve göz korumasından oluşan kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Aşılama sonrasında eller yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 24 ay, $\leq -20^{\circ}\text{C}$ 'de kesintisiz ön depolamadan sonra olsun veya olmasın en fazla 24 ay boyunca.

Buzdolabında $2-8^{\circ}\text{C}$ 'de saklanmalı ve taşınmalıdır. Işıktan korunmalı ve dondurulmamalıdır.

Sulandırıldıktan sonraki raf ömrü: Hemen kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış ürün veya atık maddeler, tıbbi atık ürünlerine ilişkin ulusal mevzuatlara göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Çözücü: Halojenobutil kauçuk tıpa ve renk kodlu alüminyum kapak ile kapatılmış 35 ml ve 84 ml'lik (1000 ve 25000 doz) polietilen flakonlarda kutusuz olarak sunulmaktadır.

Polipropilen (kap) ve polipropilen/polietilen (kapak) temas tabakasına sahip sızdırmaz alüminyum laminat kaplarda

PET plastik kutularda 1000 doz 6 kap

PET plastik kutularda 2500 doz 6 kap

PET plastik kutularda 5000 doz 6 kap

PET plastik kutularda 10000 doz 6 kap

PET plastik kutularda 1000 doz 12 kap

PET plastik kutularda 2500 doz 12 kap

PET plastik kutularda 5000 doz 12 kap

PET plastik kutularda 10000 doz 12 kap

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle; eczane, veteriner muayenehaneleri ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 29.01.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 14.12.2010

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Intervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.

Esentepe mah. Büyükdere cad. No: 199 Levent 199 Ofis bloğu Kat:13-14-15 34394 Şişli/
İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 Boxmeer, 5831AN, Hollanda