

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Nobilis® ND Clone 30
Oculonasal Süspansiyon ve İçme Suyu için Liyofilizat

BİLEŞİMİ

Nobilis ND Clone 30 Newcastle hastalığına (ND) karşı bağışıklık amacıyla hazırlanmış canlı liyofilize aşıdır. Her doz, en az 10^6 ELD₅₀ miktarında (ND) Clone 30 suşu içerir. Aşı peleti stabilizer ve gentamisin içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

Newcastle hastalığına karşı tavuk ve hindilerde bağışıklık sağlanması.

Aşılamadan sonra hastalığa karşı yaklaşık 6 haftalık bir bağışıklık sağlanmaktadır. Daha uzun bağışıklık için tekrar aşılama yapılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Aşı, sprey, göz ve burun içi ya da içme suyuna katılarak kullanılabilir. Göz/burun için uygulamalarda özel bir diluent olan Diluent Oculo Nasal kullanılır.

Aşı, kaplarda dondurularak kurutulmuş küreler halinde satışa sunulmaktadır. Kaplar ile sunulduğu durumlarda içerikler kahverengi ya da kaba yapışık durumdaysa kullanmayınız, bu durum kabın bütünlüğünün bozulduğunu göstermektedir. Her kap açıldıktan sonra hemen ve tamamen kullanılmalıdır.

Göze damlatma/İntranasal Uygulama: Aşıyı uygun miktarda uygun bir seyreltici ile sulandırın ve standart bir damlalık (damlacık boyutu bilinen ve uygun olan) aracılığıyla uygulayın. Göz veya burun damlası uygulaması için gereken seyreltici miktarı, doz sayısına ve damlacık boyutuna bağlıdır, ancak 1000 doz başına yaklaşık 35 ml kullanılır. Bir burun deliğine veya bir göze bir damla uygulanmalıdır. Kuşu serbest bırakmadan önce burun damlasını inhale ettiğinden emin olun.

Sprey yöntemi: Aşıyı %2 yağsız sütün eklenebileceği soğuk, temiz suda sulandırın. Kaplar suya dökülmelidir. Klorlu su kullanılmamalıdır. Aşıyı içeren su kullanılmadan önce iyi karıştırılmalıdır. Sulandırdıktan sonra süspansiyon temiz görünecektir. Su ve sprey aparatları tortulardan, korozyondan, dezenfektan ve antiseptik kalıntılarından arı olmalıdır (tercihen sadece aşılamada kullanılan malzemeler). Sulandırma için seyreltici hacmi, kanatlı hayvanlara püskürtüldüğünde eşit bir dağılım sağlamak için yeterli olmalıdır. Bu, aşılanan kanatlıların yaşına ve yönetim sisteminde göre değişiklik gösterecektir ancak 1000 doz başına 250 ila 500 ml su önerilmektedir. Aşı süspansiyonu 30-40 cm uzaklıktan, tercihen kuşlar loş ışıktaki beraber otururken üzerlerine eşit olarak püskürtülmelidir.

Uygulanabilirse; sprey kaybını önlemek için havalandırmayı azaltın veya durdurun.

İçme suyu: Kapların içeriği suya dökülmelidir. Aşıyı içeren su kullanılmadan önce iyi karıştırılmalıdır. Sulandırdıktan sonra süspansiyon temiz görünecektir. Aşı, demir ve klorin içermeyen serin ve temiz suda çözündürülmelidir. Her litre suya 2 gram yağsız süt tozu eklendiğinde virüs çok daha uzun süre etkinliğini korur. Aşı ile ilaçlandırılmış suyun 2 saat içinde alınması sağlanmalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak, aşılamadan önce kuşların sudan kesilmesi önerilebilir. Yeterli içme alanı sağlamak için yeterli sayıda su kabı şarttır. Bunlar

temiz olmalı ve deterjan ve dezenfektan içermemelidir. 1000 dozu, kuşların gün cinsinden yaşı kadar litre suda, maksimum 40 litreye kadar çözün. Aşılama, su içmenin ana periyodu veya sıcak bir günün serin periyodu olduğu için sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır. Daha büyük sürüleri aşılarken, aşının sadece bir kısmını çözerek başlamanız tavsiye edilir. Aşı merkezi bir su kaynağı veya oranlayıcı yoluyla yapılıyorsa çok dikkatli olunmalıdır. Standart dozlar arasındaki kanatlı sayıları için bir sonraki yüksek doz seçilmelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Aşı, 1 günlükten itibaren güvenle kullanılabilir.

İlk ve takip edecek aşılanmanın zamanı ve metodu lokal şartlara bağlı olup Veteriner Hekim'in görüşüne başvurulmalıdır. Bağışıklık oluşumu ve süreğenliği sürünün genel sağlık ve kondisyon durumu ile yakından ilgilidir

Sadece sağlıklı hayvanları aşılayınız.

Yumurtlama sürecinde yapılan aşılamalar yumurta veriminde geçici bir düşmeye sebep olabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Ürünle kullanılmak üzere verilen sulandırıcı dışında diğer veteriner tıbbi ürünlerle karıştırmayınız.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Yoktur.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Sıfır "0" gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Yoktur.

GENEL UYARILAR

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Aşılama sonrası elleri ve ekipmanı yıkayıp dezenfekte ediniz.

Aşılama sonrası dönemde hijyen ve genel bakım şartları büyük önem taşır.

Aşıyla temastan kaçınılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

2-8 °C'de dondurulmadan saklanmalıdır. Liyofilizatın raf ömrü 24 aydır. Kaplar açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Artan aşı yakılarak ya da kaynatılarak imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

1000 dozluk 12 kap içeren PET plastik kutu
2500 dozluk 12 kap içeren PET plastik kutu.
5000 dozluk 12 kap içeren PET plastik kutu.
10000 dozluk 6 kap içeren PET plastik kutu.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 26.01.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 14.12.2010

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Esentepe mah. Büyükdere cad. No: 199 Levent 199 Ofis bloğu Kat:13-14-15 Şişli/ İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

1-Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35 Boxmeer, 5831AN, Hollanda
2-Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L.,
Poligono Industrial El Montalvo I, C. Zeppelin, 6, 37008 Carbajosa de la Sagrada, Salamanca,
İspanya