

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Nobivac®

PUPPY DP

356029 R1



LİYOFİLİZE PELET
VETERİNER AŞI



BİLEŞİMİ

NOBIVAC PUPPY DP, hücre hattı doku kültüründe geliştirilmiş canlı-attenüe köpek Distemper virüsü (CDV suş Onderstepoort) ve köpek Parvo virüsü (CPV suş 154) suşlarını içerir. Liyofilize ve tek dozluk şişelerde sunulan Nobivac Puppy DP'nin her bir dozu köpek Distemper virüsünün Onderstepoort suşundan en az 10^5 TCID₅₀, köpek Parvo virüsünün attenuue C154 suşundan 10^7 TCID₅₀ içerir. Aşı aynı zamanda stabilizatör ve iz miktarda antibiyotik içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Köpeklerin Distemper virüsü (CDV) ile Parvo virüs enfeksiyonlarına (CPV) karşı aktif bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Sulandırılmış bir şişe içeriği derialtına enjekte edilir. Nobivac Puppy DP aşısı uygulamadan hemen önce 1 ml Nobivac solvent ile karıştırılır. Sulandırıldıktan sonra en geç 30 dakika içinde uygulanmalıdır.

ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI

Nobivac Puppy DP, köpek distemper virüsü ve/veya köpek parvovirusuna karşı yüksek seviyede maternal antikora sahip hayvanlarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Hayvanların yaşı, maternal antikorlarla aşının çakışmaması için, genellikle, en az 6 haftalık olmalıdır. Hem bazı köpeklerin sahip oldukları yüksek maternal antikorlar nedeniyle bu yaşta aşıya cevap vermeyebilecekleri düşünülerek ve hem de hepatitis (Canine Adenovirus Tip1), CAV2 enfeksiyonları ve parainfluenzadan korunmak için Nobivac DHPPi ile tekrar aşılama önerilmektedir.

Nobivac Puppy DP ile aşılamının, kapsamlı bir aşılama programının bir parçası olduğu düşünülerek aşağıdaki tavsiyelere uyulması önerilir.

4-6 haftalıkken: Nobivac Puppy DP

8-9 haftalıkken: Nobivac DHPPi + Nobivac Lepto

12 haftalıkken: Nobivac DHPPi + Nobivac Lepto veya Nobivac DHPPi + Nobivac Rabies

TEKRAR AŞILAMA

Köpeklerin;

- Distemper ve hepatitise karşı her 2 yılda bir,
- Parvo virüs ve parainfluenza'ya karşı her yıl
- Kuduzla karşı her 3 yılda bir aşılanması önerilir (ilgili ülke yasalarına göre değişebilir).

UYARILAR

Sadece sağlıklı köpekler aşılanmalı ve aşılamadan önce hayvanın sağlıklı olduğu klinik muayene ile kontrol edilmelidir.

Aşılamayı takip eden 14 gün içinde enfeksiyona yol açabilecek kaynaklarla temas edilmemesine dikkat edilmelidir.

Aşılama sırasında steril ekipman kullanılmalı ve aynı zamanda ekipmanın dezenfektan artışıyla bulaşık olmamasına dikkat edilmelidir.

KONTRENDİKASYONLARI

Yabancı proteinlerden dolayı muhtemel olarak hafif anafaktik tip hipersensitivite görülebilir. Bu tip reaksiyonlar birçok olguda kendini sınırlar niteliktedir.

AŞI REAKSİYONLARI

Aşılama sonrası nadiren, tüm yabancı proteinlerde görülebilen, hafif seyirli anafaktik bir aşın duyarlılık gelişebilir. Bu reaksiyonlar çoğu zaman kendiliğinden kaybolur.

YASAL ARINMA SÜRESİ

Uygulanamaz.

DİĞER BİLGİLER

Tecrübeler, bir batında doğan yavrularda dahi maternal antikor seviyelerinin çok farklı olabileceğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla yavruların antikor seviyelerini belirlemede annenin serolojik durumu tek başına yeterli bilgi veremeyebilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI

2-8°C'de karanlık ortamda saklanmalıdır. Buzdolabından çıkardıktan sonra uzun süre oda ısısında bekletilmemelidir. Sıcak yaz günlerinde, aşının etkisi birkaç saatte ciddi oranda düşebilir.

Nobivac Solvent oda ısısında bekletilebilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

5, 10, 25 ya da 50 flakon içeren karton kutularda satılmaktadır.

ATIK MATERYALLERİN İMHA ŞARTLARI

Ulusal mevzuat şartlarına uygun olarak imha edilir.

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ

İntervet Vet. İlaç. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199 Ofis Bloğu Kat:13-14-15 Şişli/İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

INTERVET INTERNATIONAL B.V.
Wim de Körverstraat 35 Boxmeer, 5831AN, Hollanda

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 14.12.2010

