

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
SCALİBOR®
Veteriner Ektoparaziter (İnsektisit-Akarisit)
İlaçlı Tasma

BİLEŞİMİ

Scalibor, her biri %4 deltametrin içeren kahverengi, beyaz veya siyah renkte ilaçlı tasmadır. Renklendirici olarak titanyum dioksit (E171) veya demir oksit (E172) bulunmaktadır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikler

Scalibor İlaçlı Tasma, antiparaziter olarak sentetik piretroit grubundan akarisit ve insektisit aktivitesi ile karakterize deltametrin içerir. Deltametrin, sodyum kanallarının geçirgenliğini değiştirerek etki eder ve parazitlerin aşırı uyarılmasına neden olur. Bunu felç (şok etkisi), titreme ve parazit ölümleri takip eder.

Deltametrin, *Leishmania infantum* vektörlerine ve kum sineklerine (protozoan, leishmaniasis ajanı) karşı kovucu bir etkiye sahiptir.

Farmakokinetik özellikler

Deltametrin tasmadan yavaşça ve kademeli olarak köpeğin tüyelerine salınır. Etkin madde cilde temas eden bölgeden, tüm cilt yüzeyine lipitler aracılığıyla ve tüylere yayılır. Deltametrinin ciltten emilimi düşüktür.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

Köpeklerde kene ve pire mücadelesinde kullanılır. 6 ay süre ile kene enfestasyonuna karşı koruma sağlar. 4 ay süre ile pire enfestasyonunu engeller. Erişkin sivrisineklere (*Culex pipiens pipiens*) karşı 6 ay süre ile ‘‘anti-feeding’’ etki sağlar. Tek tedavi, kum sineklerine karşı (*Phlebotomus perniciosus*) 12 ay süre ile uzaklaştırıcı etki sağlar.

Phlebotomus perniciosus’a karşı uzaklaştırıcı etkisi nedeniyle Leishmania koruma programının bir parçası olarak kullanılabilir fakat *Leishmania infantum*’un kum sinekleri ile bulaşmasının çevresel faktörelere de bağlı olduğu göz ardı edilmemelidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Her hayvana 1 tasma hayvanın boynunu sıkmadan takılır. Artan tasma kısmı 5 cm pay bırakılarak kesilir. Yavru köpeklerde 7 haftadan sonra uygulanabilir. Enfekte bir bölgeye girmeden 1 hafta önce tasmanın takılmış olması gerekir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Tasmanın etkisi bir hafta sonunda görüleceğinden, tasmanın hayvanlar enfestasyona maruz kalmadan bir hafta önce takılması daha uygun olacaktır.

Tasma hayvanın boynunda olduğu sırada, nadiren de olsa kene yapışması veya kum sineği ısırığı görülebilir. Bu nedenle, olumsuz koşullar altında, bulaşıcı hastalıkların keneler veya kum sinekleri yoluyla bulaşması tamamen göz ardı edilemez.

Şampuanın etkinlik süresi üzerine etkisi henüz araştırılmamıştır.

Cilt lezyonları olduğu takdirde semptomlar geçene kadar tasma çıkarılmamalıdır.

Gebelikte Kullanım: Deney hayvanları üzerindeki çalışmalar (sıçanlar, tavşanlar) deltametrinin teratojenik etkisini göstermemiştir. Gebelik sırasında ilacın dişi köpekte güvenliliği kanıtlanmamıştır. İlacın gebe dişilerde kullanımı tavsiye edilmez. Emzirme döneminde tasma dişi köpeklere takılabilir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Nadir durumlarda, boyun seviyesinde lokal veya sistemik aşırı duyarlılık reaksiyonunu işaret eden lokal cilt reaksiyonları (kaşıntı, eritem, tüylerde dökülme) gözlenmiştir.

Çok nadir vakalarda cilt tahrişine bağlı davranış bozuklukları (örneğin uyuşukluk veya hiperaktivite) da bildirilmiştir.

Çok nadir durumlarda, kusma, ishal ve hipersalivasyon gibi gastrointestinal semptomlar gözlenmiştir.

Çok nadir durumlarda, ataksi ve kas titremeleri gibi nörolojik problemler gözlenmiştir. Belirtiler genellikle tasmanın çıkarılmasından sonraki 48 saat içinde kaybolur.

Bu semptomlardan herhangi biri meydana gelirse, tasma çıkarılmalıdır. Bilinen spesifik bir antidot olmadığından tedavi semptomatik olmalıdır.

İstenmeyen olayların sıklığı şu şekilde tanımlanır:

- Çok yaygın (tedavi görmüş her 10 hayvan içinde 1'den fazla hayvanda istenmeyen etki)
- Yaygın (tedavi görmüş 100 hayvanda 1 ila 10 hayvanda)
- Yaygın olmayan (tedavi görmüş 1000 hayvanda 1 ila 10 hayvanda)
- Seyrek (tedavi görmüş 10000 hayvanda 1 ila 10 hayvanda)
- Çok seyrek (izole vakalar dahil olmak üzere tedavi edilen her 10.000 hayvanda 1'den az)

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Piretroid veya organofosfat sınıfındaki diğer ektoparazitler ile birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Uygulama şekli nedeni ile doz aşımı tehlikesi bulunmamakla birlikte, nadir de olsa tasma ya da etken maddelere karşı gelişen deri reaksiyonlarında semptomatik sağaltım uygulanmalıdır.

Tasmanın köpek tarafından kazara yutulması durumunda, aşağıdaki zehirlenme belirtileri görülebilir: hareketlerde koordinasyon bozukluğu, titremeler, hipersalivasyon. 48 saat içinde geri dönüşümlüdür. Benzodiazepinler, özellikle diazepamı dayalı semptomatik tedaviler başlatılabilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) : Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Elde veri olmadığından, 7 haftadan küçük yavru köpeklerde kullanılmamalıdır. Cilt lezyonları olan köpeklerde kullanılmamalıdır. Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık olması durumunda kullanılmamalıdır. Kedilerde kullanılmamalıdır. Deltametrin kedilerde toksiktir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Bu ürünün yanlışlıkla yutulması nörotoksik etkiler dahil, istenmeyen etkilere neden olabilir.

Ürün orijinal ambalajında saklanmalıdır. Ürün kullanılıncaya kadar poşetinde saklanmalıdır.

Tasmaı kullanırken sigara içmeyin, içecek içmeyin veya yemek yemeyin. Çocukların tasma ile oynaması veya ağızlarına koymaları önlenmelidir. Tasmadan kalan veya kesilen kısımlar derhal atılmalıdır. Tasmaı hayvana taktıktan sonra ellerinizi soğuk suyla yıkayın.

Tasma veya tasmanın takıldığı köpek ile uzun süreli temastan kaçının. Buna tasmanın takıldığı köpeklerle aynı yatakta uyumak da dahildir, bu özellikle küçük çocuklar söz konusu ise önemlidir. Ağızdan maruz kalma veya yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora danışılmalı ve bu prospektüs veya etiket doktora gösterilmelidir.

Deltametrin, duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonlarına neden olabilir.

Deltametrine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişiler, veteriner tıbbi ürün ve tedavi edilen hayvanla temastan kaçınmalıdır. Aşırı duyarlılık reaksiyonu olduğu takdirde doktora başvurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Özel saklama koşullarına ihtiyaç duyulmadan, kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler ilgili mevzuata göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

Bu ürün balıklar ve diğer suda yaşayan organizmalar için zararlı olduğundan akarsulara atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Polietilen alüminyum kraft kağıt poşet içinde 48 cm veya 65 cm boyunda 1 ve 6 adet tasma vardır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehanelerinde, polikliniklerde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 03.06.2021

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 27.12.2002-08/784

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Intervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.

Esentepe mah. Büyükdere cad. No: 199 Levent 199 Ofis bloğu Kat:13-14-15 Şişli/ İstanbul

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ

Intervet Productions SA

Rue de Lyons, 27460 Igoville/FRANSA