

**T61™**Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Ötenazi Çözeltisi

BİLEŞİM: Her ml'sinde 200 mg embutramid, 50 mg mebezonyum iyodid ve 5 mg tetrakain hidroklorid içeren renksiz, steril ve berrak bir enjeksiyonluk çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Embutramid güçlü narkotik etkiye sahiptir. 15 mg/kg dozda intravenöz uygulama köpekte anestezide, 25 mg/kg doz ise derin anestezide neden olmaktadır. Mebezonyum iyodid sinir sonlarında stimülasyonun kas fibrillerine geçişini bloke ederek etkimektedir. Doza bağlı olarak önce ekstremiteler kasları, sonra göğüs ve solunum kasları paralyze olur. Ölüm dolaşım yetersizliği ve anoksi sonucu oluşmaktadır. Köpekte 1-2 mg/kg dozda intravenöz verildiğinde belirgin kuruiform etki oluşmaktadır. Mebezonyum hayvanları strese sokacak şekilde solunum depresyonu yapmaktadır. Ancak hayvanlar bu sırada bilinçli değildirler.

Tetrakain hidroklorid anestezik etkiye sahiptir.

Bu üç etken maddenin kombinasyonu eksitasyon oluşmaksızın hızlı ötenaziye yol açmaktadır. Yavaş emilimi nedeniyle oral uygulamadan sonra etkisi geç görülmektedir. İntravenöz veya intrapulmoner enjeksiyondan sonra emilimi çok hızlıdır. Köpeklere intravenöz enjeksiyondan sonra Embutramid başlıca akciğerler, böbrekler, kan ve beyin olmak üzere çeşitli organlara yayılmaktadır. Hayatta kalma durumunda T61 bileşenleri karaciğerde metabolize olur ve başlıca böbrekler yoluyla atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR: Kedi, köpek, at ve kuşlarda eksitasyonsuz ötenazi amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Sadece bilinci kapalı hayvanlara uygulanır.

Köpek: Intravenöz enjeksiyon : 0.3-0.5 ml/kg vücut ağırlığı
Intrapulmoner enjeksiyon : 7.0-10.0ml 10 kg vücut ağırlığına kadar
13.0-20.0 ml 10 kg'ın üzerindeki köpekler için

Kedi: Intrapulmoner enjeksiyon 1.0ml birkaç günlük yavrular için
3.0 ml 6 aylığa kadar olanlar için
5.0ml 6 aylıktan büyükler için
10.0ml 5 kg'dan daha ağır olanlar için

At: Intravenöz enjeksiyon 4.0-6.0ml/50 kg vücut ağırlığı
Diğer hayvanlar: Intrapulmoner enjeksiyon Vücut ağırlığına bağlı olarak 0.5-2.0ml

İSTENMEYEN ETKİLER: Çok nadir olguda, konvülsiyon ya da eksitasyon rapor edilmiştir. Kardiyak arrest gecikebilir.

Not: T61 kullanımı endotelial lezyonlar, pulmoner konjesyon, pulmoner ödem ve hemoliz gibi histopatolojik bulgulara yol açabilir. Başka bir yan etki görüldüğünde lütfen veteriner hekiminize danışın.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT: Uygulanabilir değil.

Diğer ilaçlarla etkileşim ve şekli: Bilinmemektedir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: İnsan tüketimine sunulacak hayvanlarda kullanılmamalıdır. T61 ile ötenazi uygulanan hayvanlar ulusal tehlikeli madde yasalarına tâbidir.

KONTRENDİKASYONLAR: Bilinci açık hayvanlarda kullanılmaz.

GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE KULLANIM: Gebe hayvanlarda kullanılmaz.

ÖZEL UYARILAR: Hayvanlarda kullanımına ilişkin özel uyarılar:

- Sadece veteriner hekim tarafından kullanılmalıdır.
- Elverişsiz kullanım şartları veya absorpsiyon koşulları altında bilinci açık hayvanlarda olası bir boğulmayı önlemek için T61 yalnızca bilinci kapalı hayvanlarda kullanılmalıdır.
- T61 kullanımı sırasında özel dikkat gerekmektedir.
- Intravenöz enjeksiyon sırasında tam dozun doğru intravasküler enjeksiyonu sağlanmalıdır. Venöz kateterin kullanılması yararlı olabilir.

Uygulayıcının alması gerek önlemler:

- Ürün ile direk temastan kaçınınız.
- Kontamine olmuş giysileri hemen çıkarınız.
- Ürünün açık yara ya da mukoza ile temasında bölgeyi sabun ve bol su ile yıkayınız.
- Kazara kendine enjeksiyon durumlarında yarayı sabun ve bol su ile yıkayın ve punksiyon alanını sıkınız.
- Kazara göze geldiğinde gözleri birkaç dakika temiz su ile yıkayınız.
- Ürün kazara yutulursa vakit kaybetmeden bir hekime danışınız ve prospektüsü ya da etiketi gösteriniz.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Sadece hayvan sağlığında kullanılır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Oda sıcaklığında muhafaza edilir. Raf ömrü 36 aydır. Açıldıktan sonra 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.

KULLANIMI SONU İMHA: Uygun bir şekilde uzaklaştırılmalıdır. Çevreye atılmamalıdır. Konuyla ilgili yasal ve bilimsel yöntemler çerçevesinde imha edilmelidir.

AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTERİR TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutuda, plastik ve alüminyum kapaklı 50 ml'lik kehribar rengi cam şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Eczanelerde, veteriner hekim muayenehaneleri, poliklinik ve hastanelerinde sadece veteriner hekimlere satılır.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 02.01.2013

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE

NUMARASI: 23.08.2011 - 14/002

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ: İNTERVET VET. İLAÇ. PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. Esentepe mah. Büyükdere cad. No:199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13 34394 Levent - Beşiktaş - İstanbul

ÜRETİM YERİ: Intervet International GmbH Feldestraße 1a 85716 Unterschleißheim / Almanya