

# Nobilis®

## COR4+IB+ND+EDS



Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır



Enjeksiyonluk çözelti  
Veteriner Aşısı

### BİLEŞİMİ

Her 0,5 ml'de:

H. paragallinarum

– O83 suşu (serotip A)

– Spross suşu (serotip B)

– H-18 suşu (serotip C)

– 48 suşu (serotip varyant tip B)

– IBV M41 suşu Primer aşı uygulanmış kanatlılarda HI ünitelerinin  $\geq 2.0 \log_2$  artmasını sağlar.

– EDSV'76 BC 14 suşu

– NDV Clone 30 suşu

en az 1 CPD70\*

en az 1 CPD70

en az 1 CPD70

en az 1 CPD70

$\geq 3.2 \log_2$  HI ünitesi sağlar

Her 1/50'lik doz için HI ünitelerinin  $\geq 4,0 \log_2$  olmasını sağlar veya

$\geq 50 PD_{50}$  ünitesi içerir

Adjuvan

Yağ içinde sulu çözelti

\* %70 tavuk koruma dozu

### ENDİKASYONLARI

Tavuklarda *Haemophilus paragallinarum* tarafından oluşturulan enfeksiyöz coryza enfeksiyonunu ve klinik belirtilerini azaltmak için aktif immunizasyonu uyarmak, Newcastle hastalığı, yumurta verim düşüklüğü sendromu'76 ve içerdiği Massachusetts serotipi ile viral bronşite karşı korunma sağlamak amacıyla kullanılır. Koruyucu etkisi en az bir yumurtlama dönemi boyunca devam eder.

### KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Tavuklarda 14 haftalıktan itibaren yumurtlamanın başlamasından 4 hafta öncesine kadar olan dönemde 0,5 ml aşı boyunun aşağı kısmından subkutan olarak uygulanır.

Enfeksiyöz coryza'ya karşı optimum korunmayı sağlamak için tavuklar Nobilis COR4+IB+ND+EDS ile aşılardan en az 6 hafta önce Nobilis Corvac-4 ile aşılmalıdır. Enfeksiyöz bronşitis ve Newcastle hastalığına karşı güçlü bir immün yanıt oluşması için tavukların Nobilis COR4+IB+ND+EDS ile aşılardan en az 4 hafta önce canlı aşı ile aşılması gerekmektedir. Yumurta verim düşüklüğü sendromu'76 virüsü için önceden canlı aşı uygulamasına gerek yoktur.

### AŞI REAKSİYONLARI

Aşılamaı izleyen ilk gün tavuklar biraz durgun olabilirler; ancak ikinci gün bütün hayvanlar normal hareketliliklerine dönerler. Aşılamaı takip eden ilk dört hafta içerisinde enjeksiyon bölgesinde zamanla yok olan küçük geçici bir şişkinlik oluşabilir.

### YASAL ARINMA SÜRESİ

Yoktur

### **UYARILAR**

- Aşıyı uygulamadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
- Uygulamadan önce şişeyi iyice karıştırın.
- Steril enjektör ve iğne kullanın.
- Kontaminasyondan kaçının.
- Sadece sağlıklı hayvanlarda boynun alt kısmından uygulayın.

### **MUHAFAZA ŞARTLARI**

2-8 °C'de karanlık ortamda saklanmalıdır.

### **ÖZEL UYARILAR**

Bu aşı veteriner kullanıma mahsus başka bir ilaç ile karıştırılarak uygulanmamalıdır.  
Kişi yanlışlıkla kendine enjektörde ederse hemen bir doktora başvurmalı ve prospektüsü göstermelidir.

### **DİĞER BİLGİLER**

Yumurtlama dönemindeki tavuklarda uygulanmamalıdır.

### **TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ**

500 ml'lik polietilen flakonlarda sunulmaktadır.

### **ATIK MATERYALLERİN İMHA ŞARTLARI**

Ulusal mevzuat şartlarına uygun olarak imha edilir.

### **PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ:**

İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.  
Büyükdere cad. No:127 Astoria Kuleleri B blok Kat:8 34394 Esentepe, İstanbul

### **ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
P.O. Box 31 5830 AA  
Boxmeer, Hollanda

**Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı**  
**Pazarlama izin tarih ve no: 29.11.2005-026868**

