

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

NOBILIS® CORYZA

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Veteriner Aşı

BİLEŞİMİ

Aktif bileşenler: Her doz aşıda, *Avibacterium paragallinarum* 083 (serotip A), Spross (serotip B) ve H18 suşları (serotip C)'den en az 1 CPD70 içerir. Aktif bileşenler, sulu saponin adjuvanı içinde süspanse edilmiştir.

ENDİKASYONLAR

Aşı, *Avibacterium paragallinarum* enfeksiyonlarından korunmak amacıyla uygulanır.

ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI

Tavuklar 10 haftalıktan itibaren aşılanabilir. Damızlık ve yumurtacılarda aşılama üzerinden 52 haftaya kadar varan bağışıklık elde edilebilmesi için 2 aşılama gereklidir. İlk aşılama 10–12. haftalarda, ikinci aşılama da yumurtaya girmeden birkaç hafta önce yapılmalıdır. İlk aşılama arasında en az 4 hafta geçmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU

Her bir tavuğa 0.25 ml kas içi uygulanır.

AŞI REAKSİYONLARI

Sağlıklı hayvanlarda hiçbir anormal klinik reaksiyon gözlenmez. Aşıyı müteakip birkaç hafta süren geçici bir şişkinlik gözlenebilir.

YASAL ARINMA SÜRESİ

Yoktur

UYARILAR

- Yalnız sağlıklı hayvanları aşılayınız.
- Aşıyı kullanmadan önce ısısının 15–25 dereceye gelmesini bekleyiniz
- Şişeyi, kullanmadan önce kuvvetlice ve kullanım esnasında da aralıklarla çalkalayınız.
- Steril enjeksiyon ekipmanı kullanınız.
- Açıldıktan sonra şişe içeriğinin tamamı kullanılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI

2-8 °C'de dondurulmadan saklanmalıdır.

Raf ömrü: Cam şişeler: 12 ay PET şişeler: 24 ay

Açılan şişeler 3 saat içinde kullanılmalıdır.

ATIK MATERYALLERİN İMHA ŞARTLARI

Ulusal mevzuat şartlarına uygun olarak imha edilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

250 ml aşı içeren 1000 dozluk şişeler.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 14.12.2010

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Intervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.

Esentepe mah. Büyükdere cad. No: 199 Levent 199 Ofis bloğu Kat:13-14-15 Şişli/ İstanbul

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 Boxmeer, 5831AN, Hollanda