


Nobilis®

GUMBORO inac



Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Enjeksiyonluk emülsiyon
Veteriner Aşı

BİLEŞİMİ

Tavukların, enfeksiyöz bursal hastalığına karşı bağışıklık oluşturmaya amacıyla hazırlanmış inaktif aşıdır. Nobilis Gumboro inac, hastalık etkeni virüsün bir immunojenik süşunu içerir. Virüsler, formalinle inaktif edilmiştir. Daha sonra da su fazlı yağ adjuvanlı emülsiyon içinde süşpand edilmiştir.

ENDİKASYONLARI

Aşının, damızlık hayvanlarda kullanılması önerilmektedir. Aşlanmış tavuklardan meydana gelen yavrular, sahip oldukları maternal antikorlar ile yaşamin en az ilk 4 haftasında hastalığa karşı bağışıklırlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Her bir yarkaya 0.5 ml aşı, but ya da göğüs kasından kas içi olarak uygulanmalıdır.

AŞILAMA PROGRAMI

Aşılama 16-20 haftalık yaşlarda yapılmaktadır fakat beklenen yumurtlama başlangıcına 3 hafta veya daha az kalmışsa uygulanmaz.

Hayvanlara aşı uygulanmadan önce 3-4 haftalık yaşta canlı Gumboro aşısı ile primer aşılama yapılmalı ya da Gumboro saha enfeksiyonuna maruz kalmalıdır. İkinci durumda inaktif aşı uygulanmadan önce bu serolojik olarak belirlenmelidir.

Eğer sürü bir saha enfeksiyonuna maruz kalmamışsa hayvanlar inaktif aşı uygulanmadan en az 4 hafta önce canlı Gumboro aşısı ile aşılmalıdır.

BAĞIŞIKLIK VE AŞI REAKSİYONLARI

Aşının uygun yapılması halinde yavrular Gumboro'ya karşı yaşamin en az ilk 4 haftasında direnç gösterirler. Yumurtlama döneminin sonuna yakın olan annelerin yavruları da aynı şekilde korunurlar.

Sağlıklı yarkalarda herhangi bir reaksiyon gözlenmez. Aşılamaı takip eden birkaç hafta içinde aşılama bölgesinde hafif şişkinlik görülebilir. Aşının aseptik şartlarda yapılması durumunda bu durum dokuda kalıcı bir zarar meydana getirmez.

UYARILAR

Yalnız sağlıklı yarkalar aşılmalıdır.

Aşı kullanılmadan önce oda sıcaklığına (15-25°) getirilmelidir.

Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Steril enjeksiyon ekipmanı kullanılmalıdır.

Açıldıktan sonra şişe içeriğinin tamamı 24 saat içinde kullanılmalıdır

Uygulayıcının aşığı kendisine enjekte etmesi durumunda derhal doktora başvurulmalı ve aşının yağ emülsiyonu olduğu hatırlatılmalıdır.

YASAL ARINMA SÜRESİ

Yoktur

MUHAFAZA ŞARTLARI

2-8 °C'de dondurulmadan saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Renk kodlu alüminyum kapak ve nitril kauçuk tıpa ile kapatılmış 500 ve 1000 dozluk PET (polyethyleneterafalate) şişelerde.

ATIK MATERYALLERİN İMHA ŞARTLARI

Yerel mevzuat şartlarına uygun olarak imha edilmelidir.

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ

Intervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.

Büyükdere cad. No.127 Astoria Kuleleri B blok Kat:8 34394 Esentepe/İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

P.O. Box 31 5830 AA

Boxmeer, Hollanda

G.T.H.B.İği Pazarlama İzin Tarih ve No: 14.12.2010-047186

