

Nobilis®

IB+ND+EDS



Sadece hayvan sağlığında kullanılır



Enjeksiyonluk süspansiyon
Veteriner Aşısı

Tavuklarda enfeksiyöz bronşitis (Massachusetts serotipi), Newcastle hastalığı ve yumurta düşüklüğü sendromuna karşı bağışıklık amacıyla kullanılan inaktif, kombine bir aşıdır.

Nobilis IB +ND+ EDS, her bir hastalık etkeni virüsün bir immunojenik suşunu içerir. Virüs, embriyolu yumurta üzerinde geliştirilmiş ve formalinle inaktif edilmiştir. Daha sonra da su fazlı yağ adjuvanlı emülsiyon içinde süspande edilmiştir.

BİLEŞİMİ

Beher dozdaki aktif maddeler;
IB virüsü, M41 suşu: en az 6.0 log₂ HI ünitesi
ND virüsü, Clone 30 suşu: en az 50 PD₅₀
EDS' 76 virüsü BC14 suşu: en az 6.5 log₂ HI ünitesi içerir.

ENDİKASONLARI

Aşısı, damızlık hayvanlar ve yumurtacı tavuklarda Massachusetts serotipinin sebep olduğu IB (enfeksiyöz bronşitis) hastalığı, Newcastle hastalığı ve yumurta düşüklüğü sendromundan korunmak amacıyla hayvanlara 2. aşılama olarak yapılır.

IB'nin varyant serotiplerinin görülmediği yerlerde IB bileşeni olarak sadece Massachusetts tipini içeren Nobilis aşısı kullanılır. IB'nin varyant serotiplerinin görüldüğü bölgelerde varyant suşları içeren bir Nobilis aşısı kullanılması önerilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Her bir yarkaya but ya da göğüs kasından kas içi veya boynun alt tarafından deri altı olarak uygulanabilir.

ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI

Aşısı 16–20 haftalık yarkalara ve yumurtaya girmeden en az 4 hafta önce uygulanmalıdır.

Optimal bir rapel etki için önceden IB ve ND' ye karşı canlı hazırlanmış bir primer aşıyla aşılanmış olmalıdır. En iyi etki canlı aşılamadan 6 hafta sonraki uygulamalardan elde edilmekte olup her halükarda canlı aşı yaptıktan sonra en az 4 hafta geçmeden uygulanmamalıdır.

AŞI REAKSİYONLARI

Sağlıklı yarkalarda herhangi bir reaksiyon gözlenmez. Aşılamayı takip eden birkaç hafta içinde aşılama bölgesinde hafif şişkinlik görülebilir. Lokal doku reaksiyonları oluşabilir.

YASAL ARINMA SÜRESİ

Yoktur

UYARILAR

- Yalnız sağlıklı yarkaları aşılayınız
- Aşığı kullanmadan önce ısısının 15–25 °C'ye gelmesini bekleyiniz
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız
- Steril enjeksiyon ekipmanı kullanınız
- Açıldıktan sonra şişe içeriğinin tamamı kullanılmalıdır

- Diğer aşılarla karıştırmayınız
- Uygulayıcının aşırıya kendisine enjekte etmesi durumunda derhal doktora başvurulmalı ve aşının yağ emülsiyonu olduğu hatırlatılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI

2-8 °C'de dondurulmadan saklanmalıdır.
Açılan şişeler 3 saat içinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

500 ml içeren 1000 dozluk şişeler

144525

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ

İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. İti.
Büyükdere cad. No.127
Astoria Kuleleri B blok Kat:8
34394 Esentepe/İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31 5830 AA
Boxmeer, Hollanda
G.T.H.B.'liği Pazarlama İzin Tarih ve No: HSHD-VLHŞ-09-6264//06.06.2001-016818



PSC020S10 02 01 120x160mm black