

Nobilis®

RT+IB Multi+ND+EDS

137374 R1



Sadece hayvan sağlığında kullanılır

Kombine inaktif aşı

Kompozisyonu

0.5ml'lik beher dozda;

IBV (suş M41) $\geq 4.0 \log_2$ VN ünitesi)

IBV (D207/D274 serotipine ait 249g varyant suşu

TRT suş BUT#8544

EDS'76 suş BC 14

NDV suş Clone 30

$\geq 4.0 \log_2$ VN ünitesi

$\geq 9.5 \log_2$ ELISA ünitesi

$\geq 6.5 \log_2$ HI ünitesi

\geq dozun 1/50'sinde $4.0 \log_2$ ELISA

ünitesi veya ≥ 50 PD₅₀ ünitesi

Endikasyonlar

Damızlık ve yumurtacı tavuklarda; IB virusunun Massachutes ve D207/D274

serotiplerince oluşturulan enfeksiyon, Newcastle hastalığı, EDS (Egg Drop Syndrom) ve TRT virusunun virusunun sebep olduğu hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyonlar

Bildirilmemiştir. Yanlış sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu

Her tavuğa 0.5 ml aşı, but ya da göğüs kasından kas içi olarak, ya da boyunun alt kısmından deri altı olarak uygulanmalıdır.

Hayvanlar 14-20 haftalıkken, yumurtaya girmeden en az 4 hafta önce uygulama yapılmalıdır.

Etkiliğin artırılması için (booster effect) EDS suşu dışındaki diğer suşlarla canlı primer aşılama yapılmış olmalıdır.

Inaktif aşılanmanın, canlı primer aşı uygulamasından en az 4 hafta geçtikten sonra yapılması en iyi sonucu verir.

Aşı reaksiyonları

Sağlıklı hayvanlarda aşılamaya bağlı herhangi bir reaksiyon gözlenmez. Aşı uygulama bölgesinde geçici hafif bir şişme gözlenebilir. Lokal doku reaksiyonları meydana gelebilir.

Uygulayıcı için uyarılar

Uygulayıcı: Aşırı kazara kendinize enjekte ettiğinizde en yakın acil müdahale merkezine başvurunuz ve doktora (ya da hemşireye) aşağıdaki bilgileri gösteriniz.

Doktor: Bu yağ bazlı ürünün kazara enjekte edilmesi, parmak kayıpları gibi sonuçlara neden olan şiddetli vasküler spazma neden olabilir. Özellikle parmak eti ve tendon kılıfı ile ilişkili enjeksiyon bölgesinin erken ensizyonu ve irrigasyonu önerilmektedir. Aşılanan sürü sağlıklı olmalı ve herhangi bir hastalığı bulunmamalıdır.

Uyarılar

Aşı kullanılmadan önce ısısının 15-25 dereceye yükselmesi beklenmelidir.

Kullanmadan önce ve kullanım esnasında periyodik olarak çalkalanmalıdır.

Aşılama ekipmanının temiz ve steril olduğu kontrol edilmelidir.

Kauçuk kısımlara sahip aşılama ekipmanı kullanılmamalıdır.

Şişeyi açtıktan sonra içeriğin tamamı 3 saat içinde kullanılmalıdır.



MSD

Animal Health

PSC020S10 02 1 120x160mm Black

**Yasal arınma süresi
Yoktur**

Saklama koşulları

2-8 °C'ta ışıktan korunarak muhafaza edilmelidir. Aşı dondurulmamalıdır.

Ticari takdim şekli

Renk kodlu alüminyum kapak ve nitril kauçuk tıpa ile kapatılmış 500 ve 1000 dozluk PET (polyethyleneteraftalate) şişelerde.

Atık materyallerin imha şartları

Yerel mevzuat şartlarına uygun olarak imha edilmelidir.

2.04

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ

Intervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükdere cad. No.127 Astoria Kuleleri B blok Kat:8 34394 Esentepe/İstanbul

Üretici firma: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35

P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, Hollanda

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Pazarlama izin tarih ve no: 14.12.2011-047166



PSC020S10 02 1 120x160mm Black