

Nobilis® SG 9R



SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA
KULLANILIR
LİYOFİLİZE PELET
VETERİNER AŞI



BİLEŞİMİ

Nobilis SG 9R tavuklardaki kanatlı tifosuna karşı kullanılan canlı liyofilize bir aşıdır. Beher aşı dozu, bir stabilizer içinde, 2×10^7 CFU *Salmonella gallinarum* suş 9R içerir. Aşılamadan önce pelet uygun bir diluent içinde sulandırılmalıdır.

ENDİKASYONLARI

Ticari yumurtacı tavuklarda, *Salmonella gallinarum* ve *Salmonella enteritidis*'e karşı aktif bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır. Damızlık tavuklarda kullanılmamalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

Boynun arka alt kısmından deri altı yolla her bir kanatlıya 0.2 ml. enjekte edilir.

Aşı, aseptik şartlar altında uygun bir diluentle sulandırılmalıdır. Steril bir şırınga ve iğne kullanarak az bir miktar diluent şişesinden çekilir, aşı şişesine enjekte edilir ve iyi bir süspansiyon elde edinceye kadar çalkalanır. Daha sonra bu karışım şişeden çekilerek kalan diluent şişesine enjekte edilir. Şişe içindeki aşının tamamını almak için bu prosedür birkaç kez tekrarlanmalıdır.

ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI

İlk aşılama 6 haftalıkken uygulanmalıdır. Tekrar aşılamaların 12 haftalık aralıklarla yapılması önerilir.

AŞI REAKSİYONLARI

Sağlıklı tavukların aşılınması sonucunda herhangi bir reaksiyon gelişmemektedir.

UYARILAR

- Yalnız sağlıklı tavukları aşılayınız
- Damızlık tavuklarda kullanılmamalıdır
- Aşı sulandırıldıktan sonra 2 saat içinde kullanılmalıdır
- Steril şırınga ve iğne kullanınız
- Aşılamadan bir hafta öncesinden 2 hafta sonrasına kadar olan süreçte sistemik etkili herhangi bir antibiyotik ya da substans kullanılmamalıdır.

- Aşılamadan 14 gün sonrasına kadar, uygun bir bağışıklık oluşana kadar, tavukları enfekte alanlarda muhafaza etmemelidir. Ancak, saha tecrübeleri, erken dönemde yapılan acil aşı uygulamalarının olumlu etkisi olduğunu göstermiştir.
- Aşının yanlışlıkla uygulayıcıya ya da yanındakilere enjekte edilmesi halinde lokal bir reaksiyon gelişebilir. Doktor tavsiyesine başvurulmalıdır

YASAL ARINMA SÜRESİ

Yoktur

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Aşı 2-8°C'de dondurulmadan, karanlık ortamda saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

KULLANIM SONU İMHA

Aşılamadan sonra eller ve ekipman yıkanıp dezenfekte edilmelidir. Artan aşı yakılarak ya da kaynatılarak imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

500,1000 doz içeren cam şişelerde.

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199
Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13-14-15 34394 Şişli-İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31 5830 AA
Boxmeer, Hollanda

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ:

14.12.2010

