

Nobivac® Rabies



Nobivac®

Inaktif kuduz aşısı

Kedi-köpek 1 ml kas içi veya deri altı
Diğer türler: 1 ml kas içi
Detaylı bilgi için prospektüsü okuyunuz.

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR

10 x 1 doz



231622 R3

BİLEŞİMİ

Aşı, potens değeri 2 IU'den büyük, Pasteur RIV suşundan klonlanmış, inaktif kuduz virüsü kültürü içerir. Virus, BHK 21 clone CT hücre hattı üzerinde geliştirilmiş ve beta-propiyolaktan ile inaktive edilmiştir. Sulu alüminyum fosfat süspansiyonu şeklinde sunulmuştur.

Her bir dozdaki aktif madde:

Potens testinde en az 2 IU'yi karşılayan kuduz virüsü suş Pasteur RIV suşu içerir. Prezervatif olarak tiyomersal eklenmiştir.

ENDİKASYONLARI

Sağlıklı köpek, kedi, koyun, keçi, gelincik, tilki ve atları, pratik olarak tüm sağlıklı memeli hayvanları, kuduzla karşı korumak amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

1 ml kas içi ya da deri altına uygulanır.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ

Çok dozluk şişeler açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI

	Kedi-köpek	Sığır/at	Gelincik
İlk aşılama yaşı en az	12 hafta*	6 ay*	12 hafta*
Aşılama aralıkları	3 yıl**	2 yıl**	1 yıl**
Uygulama yolu	Kas içi veya deri altı	Kas içi	deri altı

*: ilk aşılama daha erken yaşta yapılabilir ancak o zaman da türe göre değişmek üzere 12 hafta veya 6 ay sonra tekrar aşılama yapılmalıdır.

** Önerilen aşılama challenge (virüsle muamele) deneylerine göre belirlenmiştir. Kullanıldığı ülke kanunları daha erken aşılama gerektirebilir.

Serolojik muayeneler göstermiştir ki koyun, keçi ve tilkilerde en az 1 yıllık koruma sağlanmaktadır.

AŞI REAKSİYONLARI

Deri altı uygulamadan sonra enjeksiyon bölgesinde palpe edilebilir, geçici bir nodül gelişebilir.

BAĞIŞIKLIK

Aşılama sonrası 3 hafta içinde en yüksek antikor seviyelerine ulaşılır. Daha sonra korunmaya yetecek seviyede antikor miktarında sabitlenir.

UYARILAR

- Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
- Nadiren, aşılamayı takiben genel bir aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişebilir. Bu durumda deri altı adrenalin uygulaması gerekebilir.
- Kullanımdan hemen önce aşının oda sıcaklığına (15-25°C) gelmesi sağlanmalıdır.
- Steril aşılama ekipmanı kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
- Nobivac Rabies, diğer Nobivac liyofilize köpek aşılarının ve Nobivac Tricart'ın sulandırılmasında kullanılabilir. Nobivac Lepto ile birlikte uygulanabilir.

- YASAL ARINMA SÜRESİ

Yoktur.

MUHAFAZA ŞARTLARI

2-8 °C'de dondurulmadan saklanmalıdır. 10 dozluk ambalaj açıldıktan sonra bir çalışma günü içerisinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

1 doz ya da 10 dozluk flakonlarda.

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

INTERVET International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxtmeer, Hollanda

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ

Intervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199
Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13 34394
Şişli - İstanbul/Türkiye

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pazarlama İzin Tarihi: 18.02.2011